

# Bibliografia

1. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2571\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf);

2. Centers for Disease Control and Prevention Prevention of Pertussis, Tetanus, and Diphtheria among pregnant and postpartum women and their infants. (ACIP) MMWR 2008;

3. Centers for Disease Control and Prevention Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women and persons who have or anticipate having close contact with an infant aged. (ACIP) MMWR 2011;

4. Centers for Disease Control and Prevention Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women. (ACIP) MMWR 2013;

5. Grohskopf LA, Olsen SJ, Sokolow LZ, Bresee JS, Cox NJ, Broder KR, Karron RA, Walter EB. Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices – United States, 2013–2014;

6. Epicentro Vaccinazione antinfluenzale in gravidanza: l'evidenza attuale. n.d. Available at: [http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/flu\\_gravidanza.asp](http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/flu_gravidanza.asp);

7. Gallo G, Mel R, Ros E, Filia A. Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2018;

8. White SJ, Boldt KL, Holditch SJ, Poland GA, Jacobson RM.. Measles, Mumps, and Rubella. Clin Obstet Gynecol 2012.

# Sedi vaccinali

Ambulatori

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

Tramite appuntamento CUP

Sedi e orari consultabili al seguente link:

<http://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni>

## Contatti

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

tel. 010 849 8646 lun-ven dalle 9 alle 12

Email: [igiene.pubblica@asl3.liguria.it](mailto:igiene.pubblica@asl3.liguria.it)

S.C. Ginecologia e Ostetricia

tel. 010 849 2521 lun-ven dalle 9 alle 12

S.S.D. Consultorio Familiare

tel. 010 849 7269 lun-giov dalle 14 alle 17



## Le vaccinazioni in gravidanza

Abbi cura di te per prenderti cura di **LUI** e **LEI**



## L'Influenza

non abbassare la guardia...  
Specialmente in gravidanza!

L'influenza è una malattia provocata da virus che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni) ed è molto contagiosa in quanto si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, con tosse e starnuti, ma anche semplicemente parlando vicino ad un'altra persona, o per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. L'influenza stagionale contratta in gravidanza è a maggior rischio di complicanze per la donna, aumenta il rischio di ospedalizzazione, di prematurità, di basso peso del nascituro e di interruzione di gravidanza. Si raccomanda pertanto la vaccinazione a tutte le donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre durante il periodo di circolazione del virus dell'influenza.

## Strategia "cocoon"

Tutti i membri della famiglia possono essere fonte di infezione per il nascituro!

## La Pertosse

una malattia da conoscere e prevenire

La Pertosse è una malattia molto pericolosa se contratta nei primi mesi di vita, ed è una delle prime cause di morte nei bambini sotto l'anno d'età.

Nel neonato può provocare gravi difficoltà respiratorie con conseguenze neurologiche, digestive, sovrainfezioni e danni cerebrali permanenti. Con la vaccinazione in gravidanza per difterite tetano pertosse si intende offrire la massima protezione al neonato attraverso il trasferimento passivo di anticorpi che lo proteggeranno fino al momento in cui potrà essere vaccinato direttamente. Il periodo ottimale per la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza (dalla 28esima alla 32esima settimana). Il vaccino si è dimostrato sicuro sia per la donna sia per il feto ed è raccomandato in occasione di ogni gravidanza.

La vaccinazione di tutti i componenti del nucleo familiare e di coloro che saranno a stretto contatto col neonato, potrà ridurre i rischi di infezione.

## Morbillo Parotite Rosolia Varicella

le vaccinazioni pre e  
post-partum

Morbillo-Parotite-Rosolia e Varicella sono malattie virali molto contagiose che si trasmettono per via aerea e possono causare nel nascituro diverse complicanze, specialmente nei primi anni di vita.

Le vaccinazioni per Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella non sono indicate durante la gravidanza, perciò è importante che le donne in età fertile, non immuni verso queste patologie, si sottopongano a vaccinazione prima di affrontare una gravidanza. In alternativa è raccomandata la vaccinazione dopo il parto, prima della dimissione dal reparto maternità. L'allattamento materno non costituisce una controindicazione alla vaccinazione.

