

Questionario 0009000018 - Versione 00001

1. L' "Audit clinico" è?

- A. Una metodologia per il miglioramento della qualità basata sullo scambio di esperienze dei singoli professionisti
- B. Una metodologia volta ad analizzare gli aspetti strutturali e logistici di un sistema
- C. Una metodologia volta ad analizzare gli aspetti organizzativi di un sistema
- D. Nessuna delle risposte è corretta
- E. Una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari

2. Quale, tra i seguenti, rappresenta un fattore di rischio per il personale addetto alla movimentazione manuale dei carichi (MMC)?

- A. Posture di lavoro statiche e incongrue
- B. Tutte le risposte sono corrette
- C. Flessione e torsione di segmenti corporei
- D. Sollevamento di pesi e movimenti che richiedono sforzo
- E. Sedentarietà e sovrappeso

3. La FMEA/FMECA è:

- A. Uno strumento per la conduzione di un Audit Clinico
- B. Uno strumento per la valutazione degli outcomes
- C. Uno strumento di valutazione prospettico/proattivo che identifica e migliora fasi di un processo di lavoro in modo tale da assicurare un outcome sicuro
- D. Uno strumento retrospettivo/reattivo per analizzare un evento avverso ricostruendo la sequenza degli avvenimenti
- E. Nessuna delle risposte è corretta

4. L'obiezione di coscienza per la Legge sull'interruzione di gravidanza permette al personale sanitario:

- A. Di astenersi dalle procedure strettamente inerenti l'atto di interruzione della gravidanza
- B. Nessuna delle risposte è corretta
- C. Di astenersi dalle procedure inerenti la preparazione pre e post operatoria
- D. Di astenersi dalle procedure che precedono riguardano e seguono l'interruzione di gravidanza
- E. Di astenersi da tutte le procedure che riguardano l'interruzione di gravidanza

5. La teoria della comunicazione che ha affermato che " non si può non comunicare" è:

- A. La psicoanalisi
- B. La teoria di Bauman
- C. La pragmatica della comunicazione
- D. L'analisi transazionale
- E. La teoria cibernetica

6. Nel caso di ipercapnia:

- A. Nessuna delle risposte è corretta
- B. è indicata l'O2 terapia continua
- C. è indicata l'O2 terapia ad alti flussi
- D. È indicata l'O2 terapia ad alti flussi intermittente
- E. è indicata l'O2 terapia a bassi flussi

7. Quali tra i seguenti dati e informazioni occorre conoscere PRIMA di procedere a posizionamenti, cambiamenti posturali e trasferimenti di un paziente?

- A. Presenza di dispositivi (cateteri venosi o vescicali)
- B. Stato di coscienza - capacità di comprensione
- C. Diagnosi medica, diagnosi secondarie e motivo del ricovero
- D. Tutte le risposte sono corrette
- E. Livello di dipendenza

8. Tutte le seguenti affermazioni relative ai pazienti cateterizzati sono errate TRANNE:

- A. Nei pazienti cateterizzati è necessario eseguire periodicamente urinocoltura
- B. Ai pazienti con CV è necessario prescrivere di routine profilassi antibiotica per prevenire le infezioni
- C. Tutti i pazienti con un CV a lungo termine sviluppano batteriuria
- D. Quando si procede alla sostituzione del CV è necessario somministrare profilassi antibiotica
- E. E' necessario trattare con antibiotico i pazienti cateterizzati che presentano batteriuria asintomatica

- 9. Il metaparadigma dell'infermieristica si articola in concetti relativi a:**
- A. Persona salute malattia assistenza infermieristica
 - B. Persona salute malattia assistenza infermieristica
 - C. Persona ambiente salute assistenza infermieristica
 - D. Persona assistenza infermieristica valori
 - E. Persona ambiente salute valori
- 10. I sistemi di segnalazione / incident reporting che aiutano maggiormente gli operatori ad "imparare dall'errore" sono:**
- A. Limitati ad eventi avversi che causano danni gravi
 - B. Stabiliti per legge
 - C. Obbligatori
 - D. Volontari non sanzionatori
 - E. Limitati ad eventi avversi che causano danni lievi
- 11. Quante compresse da 0,250 mg. si devono somministrare per ottenere 0,125mg. di dosaggio?**
- A. Secondo quanto indicato nella prescrizione medica
 - B. 4 compresse
 - C. ½ compressa
 - D. 2 compresse
 - E. Nessuna attendo l'arrivo del farmaco col giusto dosaggio
- 12. La prevenzione primaria non comprende:**
- A. Educazione sanitaria
 - B. Nessuna delle risposte è corretta
 - C. Vaccino profilassi
 - D. Campagne di screening
 - E. Rimozione dei fattori di rischio
- 13. Per favorire l'acidificazione delle urine si devono assumere:**
- A. Latticini
 - B. Crucifere
 - C. Più liquidi (aumentare l'introduzione di acqua)
 - D. Solonacee
 - E. Spremute di agrumi e mirtillo
- 14. I cibi maggiormente ricchi di proteine sono:**
- A. Frutta, pesce, latte , uova, legumi
 - B. Carne, legumi, frutta, verdura
 - C. Latte, pesce, uova, carne, legumi
 - D. Carne, pesce, uova, ortaggi
 - E. Carne, latte, pesce, ortaggi
- 15. Nell'ambito della qualità delle cure l'indicatore è:**
- A. Nessuna delle risposte è corretta
 - B. Lo standard di qualità raggiunto
 - C. Il livello di qualità accettabile
 - D. La segnalazione di errori ed eventi avversi
 - E. La specificazione quantitativa del criterio
- 16. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:**
- A. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
 - B. Ridurre le controversie legali
 - C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso
 - D. Raccogliere dati a fini statistici - epidemiologici
 - E. Tutte le risposte sono corrette
- 17. Per la misurazione delle cadute nelle strutture degenziali occorre:**
- A. Utilizzare il tasso N. cadute x N. posti letto x 100
 - B. Utilizzare il tasso N. cadute x 1000 giorni di degenza in ogni specifico reparto
 - C. Utilizzare il tasso N. cadute x 100 ricoveri solo riferito ai reparti a rischio
 - D. Utilizzare il tasso N. cadute x 100 ricoveri riferiti all'intera struttura degenziale
 - E. Utilizzare il tasso N. cadute x 100 ricoveri

18. Ad una persona che deve assumere ferro per via orale posso indicare di:

- A. Assumere il farmaco durante i pasti
- B. Assumere il farmaco lontano dai pasti
- C. Assumere il farmaco poco prima dei pasti
- D. Assumere il farmaco quando preferisce
- E. Nessuna delle risposte è corretta

19. Quando deve essere valutato il rischio di caduta?

- A. Prima della dimissione
- B. Tutte le risposte sono corrette
- C. All'ammissione del paziente e a intervalli regolari durante il ricovero
- D. A fronte di variazioni di terapia con farmaci che possono aumentare il rischio di caduta
- E. Prima del trasferimento ad altra struttura e/o prima della dimissione

20. Le alterazioni della P.A. sono determinate da:

- A. Gittata cardiaca, resistenza dei vasi, volemia
- B. Resistenza dei vasi, massa circolante e funzionalità del ventricolo sinistro
- C. Resistenza dei vasi, massa circolante e funzionalità del seno atriale
- D. Gittata cardiaca, resistenza dei vasi e centro della Pressione Arteriosa
- E. Resistenza dei vasi, funzionalità del ventricolo destro, massa circolante

21. La deprivazione prolungata di sonno può indurre tutti questi effetti tranne:

- A. Astenia
- B. Disturbi emotivi
- C. Disturbi della memoria
- D. Deliri
- E. Disturbi dell'alimentazione

22. "Stipsi, correlata a dieta inadeguata, che si manifesta con un'evacuazione settimanale" è una diagnosi infermieristica:

- A. Di rischio
- B. Nessuna delle risposte è corretta
- C. Reale
- D. Di benessere
- E. Possibile

23. Quale tra i seguenti è il più importante fattore di rischio per sviluppare un'infezione associata al CV?

- A. La durata della cateterizzazione
- B. La gestione del sistema di drenaggio
- C. La modalità di inserimento del CV
- D. L'igiene dei genitali
- E. Le condizioni cliniche del paziente

24. Le feci acoliche sono indice di:

- A. Ostruzione del tratto biliare
- B. Sanguinamento del tratto gastro intestinale basso
- C. Infezione da eschericchia coli
- D. Sanguinamento del tratto gastrointestinale alto
- E. Malassorbimento

25. A quale delle seguenti fasi dell'audit clinico si riferisce la definizione dei criteri di comunicazione?

- A. Rivalutare i risultati
- B. Preparare l'audit clinico
- C. Nessuna delle risposte è corretta
- D. Attuare l'audit clinico
- E. Attuare le azioni di miglioramento

26. Per ragionamento deduttivo si intende un procedimento logico che:

- A. Inferisce dal generale al particolare
- B. Utilizza l'analisi logica
- C. Rimane sul generale
- D. Inferisce dal particolare al generale
- E. Rimane sul particolare

27. Tutti i seguenti sono requisiti di una linea guida TRANNE:

- A. Chiarezza
- B. Validità
- C. Elaborata dalle figure professionali che la utilizzano
- D. Precisazione della forza delle raccomandazioni
- E. Riproducibilità

28. Tutti le seguenti soluzioni possono essere somministrate in via periferica TRANNE:

- A. Osmolarità ≥ 600 mOsm/L per farmaci
- B. Farmaci irritanti / vescicanti
- C. Farmaci con pH tra 5-9
- D. Farmaci che NON determinano tossicità intinale
- E. Osmolarità ≥ 900 mOsm/L per soluzioni perfusionali

29. In hospice l'équipe assistenziale deve prendersi carico dell'utente in ogni suo aspetto utilizzando strumenti di integrazione, quali?

- A. Protocolli
- B. Procedure
- C. Documentazione clinica integrata
- D. Tutte le risposte sono corrette
- E. Modello organizzativo

30. Per l'infermiere si parla di responsabilità per culpa in vigilando nel caso di:

- A. Danni procurati da personale di supporto (Oss, Ota)
- B. Nessuna delle risposte è corretta
- C. Danni procurati da coloro che agiscono sotto la responsabilità dell'infermiere
- D. Danni procurati dallo studente infermiere
- E. Danni procurati da altri professionisti che assistono il paz (es. Fisioterapista)